四庫全書

子部

普濟方卷一百五十三　明　周王朱橚　撰

熱病門

熱病心腹脹滿論

夫熱病服冷藥及飲冷水過多結在心下故心腹脹痛此為藏虛先有舊澼故也或吐下已後病不觧內外有熱亦心腹脹滿此為有實也

方

檳榔散（出聖惠方）　治熱病心腹脹滿四肢煩悶不欲飲食宜服

檳榔　白朮　枳殻（麩炒微黄去瓤）　人參（去蘆頭）　陳橘皮（湯洗去白瓤焙）　麥糵（麩炒微黄各一兩）　川大黄（剉碎微炒）　甘草（炙微赤剉各三分）

右為粗散每服三錢以水一中盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候温服

赤芍藥散　治熱病心腹脹滿或時疼痛飲食全微宜服

赤芍藥 柴胡去苗 桔梗去蘆頭 赤茯苓 鼈甲塗醋炙令黄剉去裙襴 郁李仁湯浸去皮尖微炒各半兩 木通三分剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

訶梨勒散出聖惠方 治熱病心腹脹滿不能飲食四肢羸乏宜服

訶梨勒三分去核生用 赤茯苓一兩半 陳橘皮湯浸去白瓤焙 人參去蘆頭 白朮 檳榔各一兩 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

人參散出聖惠方 治熱病出汗後心腹脹滿嘔逆少氣宜服

人參去蘆頭 木香 半夏湯洗七遍去滑 甘艸炙微赤剉 白术 陳橘皮湯浸去白瓤焙各三分各半兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

厚朴散出聖惠方 治熱病傷冷太過腹脹嘔逆不納飲食宜服

厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟 半夏湯洗七遍去滑 人參去蘆頭各一兩 藿香 訶梨勒皮各三分 陳橘皮湯浸去白瓤焙 甘草炙微赤剉各半兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

柴胡散出聖惠方 治熱病得汗後熱不解心腹脹滿宜服

柴胡去苗 赤芍藥各一兩 白术 檳榔 桔梗去蘆頭 甘艸炙微赤剉各半兩 枳實麸炒微黄去瓤 黄芩 訶梨勒皮各三分

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

木香丸出聖惠方 治熱病得汗後心腹脹滿疼痛宜服

木香 檳榔 訶梨勒皮各一兩 桂心 桃仁湯浸去皮尖雙仁麸炒研 枳殼麸炒微黄去瓤各半兩

右為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服以生薑湯下

二十九

大建中湯出十便良方　治熱自腹中或從背膂漸漸蒸熱日間小劇至夜漸退或寐而汗出小便或赤或白而濁甚則頻數尿精夜夢鬼交日漸羸瘦此由思慮太過心氣耗弱陽氣流散精神不收陰無所使治屬費力

芍藥三兩　黄蓍　遠志　當歸　澤瀉各一兩半　龍骨

人參　甘艸各一兩

右為粗散每服五錢水二盞生薑三片棗一枚壁泥少許煎至一盞去滓食前温服一方以菖蒲代遠志

參橘丸出十便良方 治熱從腹起上循胷脘繞頸與額初似温温漸至大熱發作無時遇飢愈劇中脘不利善食而瘦其色蒼黄肌肉不澤口唇乾燥此由脾氣素弱㑹因他病差後悮投熱藥入于脾脾熱則消穀引食消肌肉其脉濡弱而病治之

橘皮三兩 麥子一兩 人參一兩

右為細末蜜為丸如梧桐子大米飲下三十丸食前服若嗽加五味子一兩

熱病欬嗽

論

夫熱病邪熱容于肺則上焦煩壅其人必飲水水停心下則肺浮肺主于嗽水氣乘之故欬嗽也

方

前胡散出聖惠方 治熱病壯熱欬嗽頭痛心悶宜服

前胡去蘆頭　川升麻　地骨皮　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄各一兩　貝母煨微黄　紫菀洗去苗土各一兩半　石膏三兩半　麥門冬二兩去心焙　甘艸半兩炙微赤剉

右為粗散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候温服

麥門冬散出聖惠方　治熱病壯熱頭痛欬嗽宜服

麥門冬一兩半去心焙　葛根剉　貝母煨微黄各三分　柴胡一兩去苗　百合　川升麻各半兩　梔子仁　甘艸炙微赤剉各一分

右為麄散每服四錢用水一中盞入豉半合葱白二莖煎至六分去滓不計時候温服

生地黄飲子 出聖惠方 治熱病毒氣攻肺欬嗽喉中生瘡宜服

生地黄 切 柴胡 去苗各二兩 川升麻 玄參 川大黄 生用 貝母 煨令微黄 麥門冬 去心 百合 甘艸 炙微赤剉各一兩

右細剉和匀每服半兩以水一大盞煎至五分去滓入蜜一小匙更煎一沸放温不計時候服

郁李仁散出聖惠方　治熱病心肺煩熱上氣欬嗽不得睡臥時時渴欲飲水遍身浮腫宜服

郁李仁湯浸去皮尖　麻黄去根節　貝母煨令微黄　赤茯苓　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄　猪苓去黑皮　菾藶子仁　漢防己各一兩　桑根白皮一兩半剉

右為散每服五錢用水一大盞煎至五分去滓不計時候温服

百合散出聖惠方　治熱病心肺熱盛小便黄赤上氣欬嗽

宜服

百合一兩半 杏仁湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄 木通剉 黄芩各一兩
麥門冬去心 甘艸炙微赤剉 甜葶藶炒令紫色各三分 麻黄去根節
紫菀洗去苗土各半兩

右為散每服五錢用水一大盞煎至五分去滓不計時候温服

桑白皮散出聖惠方 治熱病欬嗽喘息促不得睡卧宜服

桑根白皮剉 天門冬去心 紫蘇莖葉 款冬花 皁

莁根皮剉 川大黄剉碎微炒各一兩 木通剉三分 甘艸半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

麻黄散出聖惠方 治熱病欬嗽不止心胷煩悶上氣喘促宜服

麻黄去根節 前胡去蘆頭 紫蘇子各三分 大麻仁 桑根白皮剉 杏仁湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄各一兩 麥門冬一兩半去心焙 甘

草半兩炙微赤剉

右為麄散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

杏仁散出聖惠方　治熱病八九日胷滿喘促欬嗽坐卧不安宜服

杏仁湯浸去皮尖雙仁　天門冬去心　川大黃剉碎微炒　黃芩各一兩

枳殼麩炒微黃去瓤　大腹皮剉　欵冬花各半兩　桑根白皮剉

甘草炙微赤剉　麻黃去根節各三分

右為散每服五錢水一大盞入燈心一撮煎至五分去滓不計時候温服

木通散出聖惠方 治熱病胷中煩滿欬嗽不止宜服

木通剉 紫蘇莖葉 赤茯苓 貝母煨令微黄 桑根白皮剉各一兩 梔子仁 川升麻 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微赤 枳殼麩炒微黄去瓤各三分

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時候温服

熱病咽喉腫痛

論

夫熱病咽喉腫痛者是脾肺熱積不散致使然也何者胃為水穀之海通于咽門肺主于氣居于膈上其氣貫于喉嚨邪熱伏留于脾肺故令咽喉腫痛也

方

射肝散（出聖惠方） 治熱病胷中妨悶咽喉腫痛噎塞不通

宜服

射干 川升麻 絡石葉 前胡去蘆頭 百合 枳殻麩炒微黄去瓤 黄藥子各一兩 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄 甘艸炙微赤剉

右爲麄散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分去不計時候温服

川升麻散 出聖惠方 治熱病咽喉腫塞連舌根疼痛及乾嘔頭疼不下食宜服

川升麻 白藥子 前胡去蘆頭 石膏各一兩 羚羊角

屑　甘艸炙微赤剉各半兩　川朴硝二兩　玄參　麥門冬一兩半去心焙

右為麤散每服五錢水一大盞入竹茹一分煎至五分去滓不計時候溫服

馬藺根散出聖惠方　治熱病咽喉閉塞連舌腫疼宜服

馬藺根　川升麻　玄參各一兩　川大黃剉生用　射干各三分　犀角屑　木通剉　棘針　甘艸炙微赤剉各半兩

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

候溫服

露蜂房散出聖惠方　治熱病咽喉中熱毒閉塞腫痛宜服

露蜂房炙　甘艸炙微赤剉　射干　川升麻　川朴硝　玄參各半兩

右為麄散每服三錢水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服

鉛霜散出聖惠方　治熱病咽喉腫痛不利宜服

鉛霜研　硼砂研　馬牙硝各一分　川升麻　黄藥子

地龍微炒 寒水石研 蛇退皮洗為灰 太陰玄精石研 甘艸炙微赤剉 牛黃半分研

右為細散入研了藥令勻每服水一大盞不計時候以新汲水調下一錢

含化犀角丸出聖惠方 治熱病心脾虛熱肺氣暴壅喉中腫痛口舌乾燥噤津有妨不下飲食宜服

犀角屑 黃藥子 子芩 鬱金 川大黃剉碎微炒

玄參 川升麻 甘艸炙微赤剉各半兩 射干 絡石葉

各三分　馬牙硝各一兩

右為末入馬牙硝研令勻煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候常含一丸嚥津

含化射干丸出聖惠方　治熱病脾肺壅熱咽喉腫塞連舌根痛宜服

射干　川升麻各一兩　硼砂研　甘艸炙微赤剉　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃細研各半兩　豉心二合微炒

右為末入研了藥令勻煉蜜和擣三二百杵丸如彈

子大每服含一丸嚥津

地黃煎出聖惠方 治熱病熱毒攻咽喉腫痛舌根生瘡宜服

生地黃汁半分 牛旁根汁 蜜三合 黃丹一兩 鉛霜一分研

杏仁二兩湯浸去皮尖雙仁細研入 太陰玄精石半兩研

右藥合和令匀入銀器内重湯煑用槐枝子攪不得住看色紫即傾入瓷盒中盛每服不計時候取如小彈子大含嚥津

治熱病毒氣攻咽喉腫痛宜服出聖惠方

太陰玄精石一兩　馬蘭子半兩　硼砂一分為末

右都研令細每服不計時候以蜜水調下一錢

又方出聖惠方

黃藥子　地龍各一兩炙微　馬牙硝半兩

右為細散每服不計時候以蜜水調下一錢

木通湯　治熱病喉中閉塞疼痛

木通剉　羚羊角鎊　芍藥　絡石各一兩　升麻二兩　射干

一兩杏仁湯浸去皮尖雙仁半兩

右為粗散每服三錢水一盞入竹葉七片煎至六分去滓食後温服三日

熱病口乾

論

夫熱病口乾者由熱毒在于脾胃故也口為脾之外候其臟若有積熱則津液枯少故令口乾也

方

蘆根散出聖惠方　治熱病口乾煩熱宜服

蘆根二兩　地骨皮　茅根剉　葛根剉　黄芩　川升麻各一兩　甘艸三分炙赤剉　麥門冬一兩半去心焙

右為麄散每服四錢水一中盞入竹茹一分煎至六分去滓不計時候温服

犀角散出聖惠方　治熱病毒氣在心脾口乾煩悶宜服

犀角屑　菥蓂根　川升麻　寒水石　葛根

胡黄連　生乾地黄各一兩　麥門冬二兩去心焙　甘艸半兩

炙微赤剉

右為細散每服一錢以新汲水調下不計時候服

黃芩丸出聖惠方治熱病心脾壅熱不退口乾煩渴時發躁悶宜服

黃芩　梔子仁　鐵粉細研　菥蓂根　馬牙硝研　寒水石各一兩

右為末入研了藥令勻煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫漿水下三十丸

蘇蘇丸出聖惠方　治熱病心脾積熱致口乾煩渴宜服

蘇蘇根　黄連去鬚　茯神各一兩　地骨皮　鐵粉　黄芩各三分　桑根白皮剉　犀角屑　人參去蘆頭　麥門冬一兩半去心焙　甘艸半兩炙微赤剉

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候小麥湯溫下三十丸

生地黄煎出聖惠方　治熱病心胷煩熱口乾皮肉黄宜服

生地黄汁　生蘇蘇根汁　生麥門冬汁各五合　蜜

二合酥一兩生藕汁三合

右一處相和于鍋中熬令稍稠每服不計時候抄服半匙

治熱病餘熱未退口乾煩渴宜服出聖惠方

知母　石膏各一兩半　甘草三分炙微赤剉

右為麄散每服五錢以水一盞入糯米五十粒煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病毒氣未解煩躁壯熱口乾悶亂宜服出聖惠方

葱白五莖拍破 豉二合 甘草半兩炙微赤剉

右以水一大盞半煎至一盞去滓入生地黄汁生牛蒡汁各二合微煖不計時候分為三服

主發熱口乾小便澁出本草

以甘蔗去皮盡令喫之嚥汁若口痛擣取汁服之

又方

用葳蕤五兩煮汁飲之

熱病鼻衄

論

夫熱病鼻衄者心臟傷熱所為也心主血肺主氣肺開竅邪熱與血氣并故衄也

方

刺薊飲子出聖惠方 治熱病頭痛壯熱鼻衄吐血心中躁硬徧身疼痛四肢煩悶宜服

刺薊 生地黃 生麥門冬去心各一兩 雞蘇 赤茯苓 生薑各半兩 青竹茹一分

右細剉以水三大盞煎至一盞半去滓不計時候分温三服

黄龍湯出聖惠方　治熱病鼻衄去五臟熱氣

伏龍肝半兩　當歸微剉炒　甘艸炙微赤剉　赤芍藥　黄芩

川朴硝　川升麻各三分　生乾地黄一兩半

右為粗散每服五錢以水一大盞入竹茹一分煎至五分去滓不計時候温服

阿膠散出聖惠方　治熱病鼻衄不止此是湯毒傷肺宜服

阿膠（搗碎炒令黃燥）　伏龍肝　黃芩　地骨皮（各三分）　豉（一合）　葱白連鬚（二莖）

右細剉令勻，都以水一大盞半煎至一盞，去滓，入生地黃汁二合，攪令勻，不計時候分溫三服。

黃芩散（出聖惠方）治熱病鼻衄不止宜服

黃芩　川大黃（剉碎微炒）　刺薊（各一兩）　梔子仁　蒲黃（各半兩）

右為散，每服四錢，水一中盞煎至六分，去滓，不計時

候溫服

熟乾地黄散出聖惠方　治熱病鼻衄出多面無顔色昏悶虚困

熟乾地黄　白芍藥　人參去蘆頭　天竺黄各三分　黄耆一兩半剉　阿膠擣碎炒令黄燥　當歸剉微炒各半兩

右為細散每服不計時候以黄耆湯調下二錢

貝母散出聖惠方　治熱病鼻衄不止

貝母煨微黄色　刺薊　蒲黄各一兩

右為細散每服不計時候以新汲水調下二錢

治熱病鼻衄不止方出聖惠方

蛤粉　香墨末各一錢　黄丹半錢

右相和令勻以新汲水調頓服

治熱病鼻衄諸藥無効者宜用此方出聖惠方

赤馬通二枚絞取汁　阿膠三片炙令微黄擣末

右相和熱攪令勻每用少許滴鼻中仍以新汲水略

𩞄足即止

治熱病衄血日夜無度身面如金出聖惠方

右以韮根一握擣絞取汁以鑵索授于井中深處良久急取出瀝水同和滴二七滴于鼻中差

治熱病鼻衄若血下數升者宜服出聖惠方

以好松烟墨二兩擣細羅為末用雞子白和丸如梧桐子大每服以生地黃汁下二十丸如人行五里再服以差為度

黃土湯出聖惠方 治鼻衄去五臟熱氣結而吐血者

當歸　甘艸炙　芍藥　芎藭各三兩　黃芩二兩　桂心一兩

生地黃一斤　青竹皮五兩　釜底下焦黃土如雞子一枚碎綿裹

右切以水一斗三升煮竹皮減三升去滓內諸藥煮取三升分二服忌海藻菘菜生葱

又方

用黃芩四兩切以水五升煮取二升分三服亦治婦人漏下血

熱病口瘡

論

夫熱病發汗吐下之後表裏俱虛毒氣未除伏熱在臟熱毒乘虛攻于心脾上焦煩壅頭痛咽乾故舌口生瘡也

方

犀角散出聖惠方 治熱病口瘡心神煩躁大小便壅滯宜服

犀角屑 甘艸炙微赤剉各半兩 黃連去鬚 川大黃剉碎微炒 黃

芩　川朴硝各一兩　川升麻三分　麥門冬一兩半去心焙

右為麄散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓温服如人行十餘里再服以利為度

川升麻散出聖惠方　治熱病口瘡壯熱頭痛心神煩躁宜服

川升麻　玄參　黃連去鬚　大青　知母　黃芩各一兩　柴胡一兩半去苗　甘草炙微赤剉　地骨皮各三分

右為麄散每服三錢以水一中盞入淡竹葉三七片

煎至六分去滓不計時候温服

大青散出聖惠方　治熱病心臟壅熱口内生瘡宜服

大青　沙參去蘆頭　川升麻　川大黄剉碎微炒　黄芩各一兩　枳殼麩炒微黄各半兩　生乾地黄一兩　川朴硝三分

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

犀角煎出聖惠方　治熱病咽喉赤腫口内生瘡不能下食宜服

犀角屑　川升麻　川大黄（剉碎微炒）　黄藥子　馬牙硝　黄蘗（剉各半兩）

右為散以水四大盞煎至一大盞入蜜三合相和更煎一兩沸放溫徐徐含嚥

龍膽煎（出聖惠方）　治熱病口瘡發渴疼痛不可忍宜塗

龍膽艸（去蘆頭）　黄連（去鬚）　川升麻　梔白皮（剉）　大青（各一兩）　竹葉　薔薇根（剉各二兩）

右細剉都以水五大盞煎至一大盞去滓入蜜三合

慢火煎成膏塗于瘡上有涎吐之

石膏煎出聖惠方　治熱病口瘡洗心除熱去喉中鳴宜服

石膏半斤細研　蜜　地黃汁各一中盞

右以水三大盞先煮石膏取一盞乃內蜜及地黃汁

復煎取一盞去滓每服抄一匙含嚥

治熱病口瘡久不愈方

天門冬一兩半去心焙　川升麻　玄參各一兩

右為末煉蜜和丸如彈子大每服以新綿薄裹一丸

含嚥津

又方出聖惠方

川升麻　黄蘗子各一兩　川大黄一兩半剉碎微炒　黄丹半兩

右為末煉蜜和丸如彈子大每服以新綿薄裹一丸

含嚥津

治熱病口瘡赤腫疼痛不可忍出聖惠方

黄蘗一兩末　臙粉一錢　馬牙硝一兩末

右件藥相和令勻每取少許貼于瘡上有涎吐却日

三兩上用

治熱病口瘡赤腫疼痛方出聖惠方

薔薇根二兩剉 黄蘗一兩半剉 馬牙硝一兩

右件藥都以水二大盞半煎至一盞半去滓温含冷吐

治熱病口瘡不飲方出聖惠方

牛膝去苗 角蒿各一兩 黄蘗半兩剉

右細剉都以水二大盞煎取一盞半去滓温含冷吐

治熱病口瘡方 出聖惠方


黃連一分去鬚 槐白皮 甘艸根各半兩

右細剉用水一大盞煎至半盞去滓温含冷吐

石膽散 出聖惠方 治熱病口舌生瘡

石膽半錢 馬牙硝一兩 黃連半兩去鬚 龍腦一錢 黃蘗剉 角蒿各一分

右為細散入龍腦石膽馬牙硝等更研細每取半錢用新綿薄裹含良久有涎即吐之



酥蜜煎（出聖惠方）　治熱病熱盛口中生瘡

酥　蜜（各三合）　大青（一兩）

右先將大青擣羅爲末入酥蜜中攪和勻慢火煎三兩沸入淨器盛不計時候含一茶匙

熱病吐血

論

夫諸受病不發其汗熱毒入深結于五臟内有瘀積故令吐血也

方

生乾地黄散出聖惠方 治熱病發汗而汗不發致內有積瘀故吐血不止宜服

生乾地黄 赤芍藥 刺薊一兩 犀角屑半兩 牡丹皮 梔葉各三分

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

大黄散出聖惠方 治熱病吐血不止心胷煩悶宜服

川大黄剉碎微炒 甘草炙微赤剉 犀角屑 赤芍藥

黄芩 生乾地黄各一兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

刺薊散出聖惠方 治熱病吐血并鼻衄不止頭面俱熱宜服

刺薊 川升麻 雞蘇莖葉 川朴硝各一兩 赤芍藥 子芩各一兩半 大青 犀角屑 甘草炙微赤剉各三分

生乾地黃二兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

竹茹散出聖惠方　治熱病吐血并鼻衄不止宜服

青竹茹一兩半　子芩一兩　蒲黃　伏龍肝末各二錢　生藕二合

右以水一大鍾半煎竹茹子芩至一盞去滓下蒲黃等三味攪令勻不計時候分為三服

犀角散出聖惠方　治熱病毒氣未解心肺積熱吐血不止

心中壅悶宜服

犀角屑　梔子仁　地骨皮　子芩　川大黄剉碎微炒　甘草炙微赤剉　茯神　川升麻　茅根剉　蘆根剉各半兩　麥門冬三分去心　生乾地黄一兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

紅藍花散出聖惠方　治熱病吐血心胷不利宜服

紅藍花　川大黄剉碎微炒各一兩　訶梨勒皮　羚羊角

屑　黄芩　刺薊各三分

右為麤散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓下赤馬通汁半合更煎一兩沸不計時候温服

又方出聖惠方

以生地黄擣絞取汁每服一小盞頻三五服即差

又方出聖惠方

以生藕擣絞取汁每服一小盞入生蜜一匙攪匀服之頻服即止

又方 出聖惠方

以生刺薊擣絞取汁每服一小盞入生蜜一匙攪勻服之頻服即止

又方 出聖惠方

以伏龍肝水浸取清每取一小盞服之

地血散 出活人書 熱毒深入吐血

茜根 四錢 大豆 二兩 黄藥子 甘艸 各一兩

右為細末每服三錢新汲水調下

三黃丸(出御藥院)治法千金方同治吐血黃疸熱病

黃連(半兩) 黃芩 大黃(各二錢半)

右件為細末煉蜜和丸如桐子大每服五十丸食前溫水下

熱病熱毒攻眼

論

夫熱病毒氣攻眼者由伏熱在臟壅滯熱毒薰蒸于肝上衝于目故也肝系于目目者肝之竅若為邪熱所攻

則赤腫疼痛或生翳障也

方

犀角散出聖惠方　治熱病熱毒攻眼赤澁腫痛宜服

犀角屑　防風去蘆頭　黄芩　川升麻　石膏　川大黄剉碎微炒　黄連去鬚　大青　甘菊花　梔子仁　甘艸炙微赤剉　麥門冬一兩去心焙各半兩

右為麁散每服三錢以水一中盞入淡竹葉三七片煎至六分去滓不計時候温服

玄參散出聖惠方　治熱病熱毒攻眼額角偏痛兩眼澁腫心神煩悶宜服

玄參　甘菊花　地骨皮　川升麻　黄連去鬚　梔子仁　柴胡去苗　甘艸炙微赤剉各半兩　麥門冬一兩去心焙

右爲麄散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

青葙子丸出聖惠方　治熱病熱毒攻眼生翳膜宜服

青葙子　防風去蘆頭　枳殼麩炒微黄去瓤各一兩　枸杞子

澤瀉 生乾地黃 石决明各一兩半 麥門冬二兩半去心焙

細辛 黃連去鬚 茺蔚子各三分 車前子二兩

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如桐子大每服以清粥飲下三十丸不計時候温服

洗眼黃蘗湯出聖惠方 治熱病毒氣攻兩眼赤腫疼痛宜服

黃蘗 黃連 當歸 甘草生用 黃芩各半兩 燈心三束

杏仁湯浸去皮尖雙仁生用 蕤仁各一分 棗五枚

右細剉都以水三大盞煎取一盞半以綿濾去滓看冷煖避風處洗眼日三五度用

洗眼梔子湯（出聖惠方） 治熱病熱毒氣攻眼生赤脉翳膜疼痛怕見光明宜服

梔子仁　黄蘗　黄芩　黄連　秦皮（剉）　決明子（微炒各半兩）　甤仁（一分）　棗（五枚）

右細剉都以水二大盞煎取一大盞以綿濾去滓避風處看冷煖洗眼日三五度用

洗眼黄連湯出聖惠方　治熱病毒氣攻眼赤腫疼痛宜服

黄連　甘草生用　秦皮　秦艽去苗各一兩　黄蘗二兩

右細剉都以水三大盞煎至二大盞温温洗眼日三五度用

治熱病毒氣攻眼腫痛點眼方出聖惠方

黄連去鬚擣碎　馬牙硝各一分　人乳汁一小盞

右將黄連馬牙硝等入于乳汁中浸經一宿濾過取清點眼日五七度

洗肝散（出聖惠方） 治熱病熱毒攻眼腫疼痛宜服

羚羊角屑　子芩　羌活　柴胡（去苗）　川大黄（剉碎微炒）

防風（去蘆頭）　梔子仁　甘菊花　黄連（去鬚）　犀角屑

甘艸（炙微赤剉各半兩）

右為粗散每服三錢以水一中盞入淡竹葉三七片

煎至六分去滓不計時候温服

治熱病後眼生翳方（出肘後方）

右燒豉二七粒為末納管中吹入鼻中

治熱病差後百日食五辛者目暗出本草

以鯽魚作臛熏之愈

熱病發狂

論

夫熱病在表或未發汗或已發吐下之後表症未解毒氣不散煩熱而渴得水不能飲表虛裏實故身體發斑狀如文錦也

方

解毒香豉飲子　治心肺藏熱毒攻于皮膚徧生赤斑重者其色紫黑宜服

香豉二兩　石膏三兩　梔子仁　大青　川升麻　川芒硝　川大黄剉碎微炒　甘艸生用各半兩

右細剉拌和令匀每服半兩用水一大盞入生薑半分葱白七寸煎至五分去滓不計時候温服

犀角散　治熱病目赤煩躁狂語坐卧不得身生赤斑宜服

犀角屑　龍膽草去蘆頭　人參去蘆頭　甘草生用各半兩　不灰木以牛糞火燒為灰細研　黄芩各一兩　川大黄三分剉碎微炒

右為麄散每服三錢以水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不計時候温服

茵陳散　治熱病發斑宜服

茵陳二兩　川大黄剉碎微炒　玄參各一兩　梔子仁一分　甘草半兩生用

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

牛黄散　治熱病發斑解毒宜服

牛黄細研　川升麻　檳榔各半兩　人參去蘆頭　川大黄剉碎　微炒各一兩　梔子仁　甘艸生用各三分　木香　犀角屑　羚羊角屑各一分

右為細散每服不計時候煎竹葉湯調下二錢

生地黄膏　治熱病溫毒大疫發斑宜服

生地黄半斤切　豉一升　雄黄細研　麝香細研各二錢

右件藥以猪膏二斤慢火煎地黄并豉三分煎至二分絞去滓入雄黄麝香攪令匀以瓷合内貯之每服不計時候以温水調下半匙服此藥後其毒皆從皮膚中出即差

觧毒犀角散　治熱病毒氣外攻皮膚斑出狂亂躁熱宜服

犀角屑　黄芩　大青　馬牙硝各一兩　梔子仁

牛黄細研　天竺黄細研　赤茯苓　黄連去鬚　甘草生用各半兩

麥門冬一兩半去心焙　麝香一錢細研

右為細散每服不計時候煎竹葉湯調下二錢

升麻散出聖惠方　治熱病發赤斑心身煩躁宜服

川升麻　川大黄剉研細炒　人參去蘆頭　犀角屑　玄參各一兩　甘草半兩生用

右為細散每服以新汲水調下二錢日四五服

黑奴丸出聖惠方　治熱病溫毒中人斑出赤者五死一生黑者十死一生大瘦難救並宜服

麻黄三分去根節 川大黄半兩剉碎微炒 川芒硝 黄芩 伏龍肝 竈突中黑土 梁上塵各一兩

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如彈子大每服不計時候以新汲水研下一丸如渴供飲水須臾當寒寒便汗出即觧如未觧更服一丸

大青散出聖恵方 治熱病熱毒斑出頭面及身

大青二兩 阿膠半兩擣碎炒令黄燥 豉一合

右件藥都以水一大盞半煎至五分去滓内膠令消

不計時候分溫二服

治熱病發斑瘡頭面及身皆戴白漿方

右取好蜜通身摩瘡上赤以蜜煎升麻數塗之

又方 出聖惠方

以升麻濃煮綿濾洗之苦酒漬彌好但痛難忍

治熱病斑發須臾徧身皆戴白漿此熱毒氣盛方

右煑葵菜葉及韮薤啖之則止

又方 出聖惠方

以鮮羊血服三二合則止初患急服之

天行熱病若發赤黑斑如疹出本艸

用青木香二兩水二升煑取一升頓服之効

熱病生熱毒瘡

論

夫臟腑虛實不調則生于客熱表有風濕與熱氣相摶則身體生瘡癢痛而膿汁出此風熱所為也

方

白鮮皮散出聖惠方 治熱病毒氣不散遍身生熱毒瘡

白鮮皮 川升麻 黄芩 玄參 犀角屑 梔子仁 赤芍藥 川大黄剉碎微炒 甘艸炙微赤剉 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄各半兩 麥門冬一兩去心焙

右為麄散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

玄參散出聖惠方 治熱病遍身生熱毒瘡癢痛有膿水

玄參 羚羊角屑 黄耆剉 川升麻 大青 漏

蘆頭去蘆 地骨皮 川大黄剉碎微炒各一兩 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

漏蘆散出聖惠方 治熱病毒氣攻皮膚生瘡癢痛

漏蘆一兩半去蘆頭 木通 藍葉 犀角屑 梔子仁 玄參 川升麻 川朴硝各一兩 甘草炙微赤剉半兩

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓入生地黄汁半合不計時候溫服

葛根散出聖惠方 治熱病累發汗毒氣不盡攻于頭面及身體發如豆頭白根紫為毒氣盛

葛根剉 川升麻 犀角屑 知母 黄芩 甘艸炙微赤剉 鬱金 川大黄剉碎微炒各一兩

右為細散每服二錢用雞子一枚取清以新汲水半盞同調藥不計時候溫服

半夏散出聖惠方 治熱病毒氣壅腫為瘡宜服

半夏湯洗七遍去滑 川大黄 乳香各一兩

右細羅為散以葱白三兩細切入諸藥同搗為膏用塗腫上可厚三分已來乾即重換

消腫退壅毒方出聖惠方　治熱病經五七日後毒氣攻皮膚生瘡腫

生油　胡荽汁各一合　雞子白二枚

右相和令匀空腹頓服如未消再服之

又方出聖惠方

川大黃二兩搗末　膩粉半兩

右相和細研用生麻油調如膏塗

又方出聖惠方

右以精猪肉薄切冷水浸裛乾搨于瘡腫上熱即換之

治熱病熱毒發瘡及頭面與身須臾周匝狀如火瘡皆影帶瘭漿或沒或生方出聖惠方

右以葵菜爛煮以蒜虀同食之即止初患急宜食之若不早治極者多死若病差後瘡瘢色黑經歲方滅

者此是惡毒時氣也永徽四年此瘡從西東流徧于海内若有此疾俱依方煮食必効

治熱病下部有䘌蟲生瘡出本艸

熬塩綿裹熨之不過三度差

治熱病後下部生瘡出本艸

濃煮桃白皮如稠餳納少許熊膽研以綿蘸藥内下部瘡上

又方

用馬蹄燒灰以猪脂和傅日五六次用之

熱病發疱瘡

論

夫熱病表虛裏實熱毒氣多發此瘡其瘡色白或赤發于皮膚頭作漿或戴白膿者其毒輕有黑紫色作根隱隱在肌肉裏其毒重甚者內五七竅皆有瘡形如豌豆故以為名也

方

大黄散出聖惠方　治熱病胃中熱毒生疱瘡如豌豆

川大黄二兩剉碎微炒　黄連一兩半去鬚　川升麻一兩　黄芩　漏蘆去蘆頭　玄參　甘草炙微赤剉各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候温服之

藍葉散出聖惠方　治熱病熱毒盛疱瘡出頭黑者為難治

藍葉一兩　犀角屑一兩半　木香一分　川升麻一兩半　瞿麥　玄參各一兩　甘草半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

犀角散出聖惠方 治熱病疱瘡出心煩熱𤸃

犀角屑 川升麻 木香 紫草 麥門冬去心 漏蘆去蘆頭各一兩 麝香一錢研 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

地骨皮散出聖惠方 治熱病生疱瘡心神煩懆

地骨皮 黄芩 黄連去鬚 川大黄剉碎微炒 木香 羚羊角屑各一兩 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不拘時温服

梔子飲子出聖惠方 治熱病生皰瘡狀如豌豆

梔子仁一兩 瞿麥 木通剉 苦竹葉 甘草炙令微赤剉各半兩 豉一合 黄芩一兩

右細剉每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

治熱病壯熱頭痛發疱瘡如豌豆出聖惠方

石膏二兩 柴胡去苗 虎杖剉 赤芍藥各一兩 梔子仁三分 知母 犀角屑 甘艸炙微赤剉各半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

發毒理氣木香散出聖惠方 治熱病發疱瘡形如豌豆

木香一分 豉一合 葱白二莖 麻黃半兩去根節 乾薄荷一分

右細剉以水一大盞半煎至一盞去滓不計時候分溫二服衣蓋取汗


治熱病毒氣盛生皰瘡如豌豆方出聖惠方

苦竹葉 小麥各二兩 石膏三兩擣碎

右以水三大盞煎至一盞半去滓不計時候分溫三服

又方出聖惠方

胡荽一握細切 生地黄三兩細切



右相和擣絞取汁空心頓服

又方 出聖惠方

右紫草二兩并根細剉以水二大盞煎至一盞去滓

不計時候分溫二服

熱病發黃

論

夫熱病發黃一身面目俱黃遍體疼痛心煩壯熱肩項

疼強腰背拘急此由寒氣在表則熱蓄于脾胃腠理不

開瘀熱在内宿穀欝蒸不得消化則大小便不通故身體面目皆變黄色凡發黄其寸口近掌無脉口鼻氣冷並不可療心死之候也

方

犀角散出聖惠方　治熱病黄疸熱渴及患酒勞胷滿氣促皮膚漸黄如金色

犀角屑一兩　葛根三分剉　通艸　人參去蘆頭　柴胡去苗各一兩　知母　藍葉　桔梗去蘆頭　赤茯苓　桑根白皮

剉 秦艽去苗各三分

右為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合攪令勻不計時候溫服

茵陳散出聖惠方 治熱病黄疸目黄如金小便如血心煩躁悶口苦頭痛

茵陳 梔子仁各三分 木通 甘艸半兩炙微赤剉 菰𦼮根一兩 麥門冬一兩半去心 柴胡一兩去苗 秦艽一兩去苗

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片煎至

五分去滓不計時候温服

龍膽散出聖惠方　治熱病黄疸熱渴額上汗出手足熱小便赤澁

龍膽艸一兩去蘆頭　川升麻半兩　麥門冬三分去心　犀角屑一兩

甘艸半兩炙微赤剉　梔子仁半兩

右為散每服五錢以水一盞入生薑半分煎至五分去滓入生地一合更煎一兩沸不計時候温服

麥門冬散出聖惠方　治熱病面目俱黄心腹堅滿氣急精

神恍忽語多倒錯

麥門冬一兩半去心焙 茵陳一兩 梔子仁 川升麻 川大黃剉碎微炒 黃芩 大青各半兩 川芒硝一兩

右麁散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

黃連散出聖惠方 治熱病黃疸遍身面目悉黃

黃連去鬚 大青 梔子仁 茵陳 柴胡去苗 黃芩 地骨皮 川芒硝 甘艸炙微赤剉各半兩 川大黃二兩剉碎

微炒

右為麤散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

茵陳散出聖惠方　治黄疸遍身並黄

茵陳　菝葜根　川升麻　龍膽艸去蘆頭各二兩　寒水石三分　甘艸一兩炙微赤剉

右為麤散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入地黄汁半合更煎一沸不計時候温服

犀角飲子出聖惠方 治心黄熱毒攻急眼黄

犀角屑 黄芩 梔子仁 川升麻各半兩 茵陳

川大黄剉碎微炒 川芒硝 甘艸炙微赤剉 甜竹葉各三分

右細剉每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計

時候温服

梔子仁散出聖惠方 治遍身黄如橘色心脇滿急

梔子仁 黄芩 柴胡去苗 川升麻 龍膽艸 川

大黄剉碎微炒各一兩 蘇蘇根一枚乾者 川芒硝二兩 甘艸半兩炙微

赤剉

右爲麄散每服四錢以水一中盞入葱白兩莖煎至六分去滓不計時候温服

苦參散出聖惠方 治熱病多有内瘀即成黄疸若用爪蒂散吹鼻中令黄汁出後多差忽然振寒便發黄皮膚如黄塵出小便赤少大便時閉氣力有異食飲不妨餘熱不除久黄者

苦參剉 黄連去鬚 甜葶藶隔紙炒令紫色 黄芩 川大黄剉碎

微炒各半兩 瓜蔕一分 黄蘗一分剉

右為細散每服以粥飲下二錢不拘時服

茵陳丸出聖惠方 治熱病發黄

茵陳半兩 恒山一分 梔子仁 鼈甲塗醋炙令微黄去裙襴 川朴硝 川大黄剉碎微炒 木香 犀角屑 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄别研如膏各一兩 川升麻 巴豆一分去皮心研紙裹壓去油

右為末入杏仁巴豆同研令匀煉蜜和擣三二百杵丸如梧子大每服空心煎烏梅湯下三丸如人行十

里或利或汗或吐為効如未應即再服三丸

猪膏髮煎方出聖惠方 治熱病諸黄

猪膏八錢 亂髮如雞子大二枚

右安猪膏等于鐺中煎令髮消盡研絞去滓不計時候分為四服如人行五里再服盡則病從小便出

瓜蔕散出聖惠方 治熱病毒貫臟腑深入骨髓之間或為黄疸黒疸赤疸白疸穀疸馬黄等疾喘急須臾不絶

又治酒疸脉浮腹滿欲嘔宜吐之

瓜蔕二七枚 赤小豆二七枚炒熟 秫米二七粒

右為細散取如大豆吹于鼻中當有黄水出為効一方為末每服半錢米飲下以吐為度

又方出聖惠方

以瓜蔕二七枚擣碎以水一中盞煎至五分去滓温服一名一物瓜蔕湯太陽中暍身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也此湯主之

治暴黄腹脹遍身如橘子色小便不利并天行温熱病

瘀熱在裏頭汗出身無汗煩渴飲水小便赤澁發黄手足冷方旅舍備要方

枳殻麩炒去瓤一兩　大黄三分　肥梔子十四枚　茵陳蒿去枝梗六兩

右為散每服三錢水一盞半煎至一盞去滓温服小便當如皁莢汁出黄從小便出也

治毒黄熱病出本艸

以東行母猪糞一升宿浸去滓頓服

熱病後脾胃虚不思飲食

論

夫熱病毒氣盛時心胸煩躁多服冷藥及過于轉瀉或飲水過多水停心下傷于胃口病折已後熱勢既退脾胃乃虛不能摧伏五穀故不思飲食也

方

人參散 出聖惠方 治熱病後脾胃虛不思飲食脇下有氣腹肚不調

人參一兩去蘆頭 枳殼麩炒微黃去瓤 甘艸炙微赤剉 黃蓍剉各半兩 沉

香一兩 厚朴二兩去麄皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前温服

白术散出聖惠方 治熱病後脾胃氣虛四肢疼痛不思飲食

白术一兩 麥門冬去心 前胡去蘆頭 桂心 白芍藥 當歸 半夏湯洗七遍去滑 甘艸炙微赤剉各半兩 黄耆剉 人參去蘆頭各三分 白茯苓 陳橘皮湯浸去白瓤各一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓食前温服

丁香散（出聖惠方）治熱病後脾胃氣不和不思飲食宜服

温中和氣

丁香　訶梨勒（煨用皮各一兩）　甘艸（炙微赤剉）　木香　人參（去蘆頭）

陳橘皮（湯浸去白瓤焙各一兩）

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓食前温服

白茯苓散出聖惠方 治熱病後脾胃氣虚冷痰滯不思飲食

白茯苓 人參去蘆頭 柴胡去苗 半夏湯洗七遍去滑 枇杷葉拭去毛炙令微黄 厚朴去麄皮塗生薑汁炙令香熟各半兩 草豆蔻一分去皮

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓食前温服

黄耆散出聖惠方 治熱病後脾胃氣虚四肢乏力骨節煩疼口乾舌苦不思飲食

黄耆剉 人參去蘆頭 白茯苓 陳橘皮湯浸去白瓤焙 枳殻麩炒微黄去瓤 訶梨勒煨用皮 白术各一兩 甘艸半兩炙微赤剉 五味子一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓食前温服

人參丸出聖惠方 治熱病後脾胃虚冷不思飲食

人參去蘆頭 陳橘皮湯浸去白瓤焙各一兩 白术 木香 厚朴去麄皮塗生薑汁炙令香熟各半兩 五味子一分

右為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服食前薑湯送下二十丸

草豆蔻丸出聖惠方 治熱病後脾胃虚冷不思飲食

草豆蔻去皮 當歸剉微炒各一兩 白术 陳橘皮湯浸去白瓤焙 甘草炙微赤剉 高良薑剉 厚朴去麄皮塗生薑汁炙令香熟各半兩 黄耆三分

吴茱萸一分湯浸七遍焙乾微炒

右為細末以麪糊和丸如桐子大每服食前以粥飲送下三十丸

參桔丸出指南方 治脾虚發熱

人參 桔梗各半兩 陳皮三分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸米飲下

熱病大便不通

論

夫熱病經發汗汗出多則津液少則胃中乾結熱在胃所以大便不通又有臓腑自生于熱者此由三焦否隔脾胃不和畜熱在内亦大便不通也

方

犀角散出聖惠方　治熱病惡寒壯熱大便不通

犀角屑　大麻仁　黄芩　土瓜根　白鮮皮

梔子仁各一兩　麥門冬一兩半去心　川大黄二兩剉碎微炒　甘草半兩炙微赤剉

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

大黄散出聖惠方　治熱病大便澁滯妄語心煩

川大黄（剉碎微炒）　羚羊角屑　川朴硝　黄芩（各一兩）　枳實（麩炒令黄色）　甘草（炙微赤剉各半兩）

右為麤散每服五錢用水一大盞煎至六分去滓不計時候温服

羚羊角散（出聖惠方）　治熱病脾胃壅熱大便不通

羚羊角屑　梔子仁　土瓜根（各一兩）　麥門冬（去心）　川大黄（剉碎微炒各一兩半）　甘草（半兩炙微赤剉）

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候温服

大麻仁丸（出聖惠方）　治熱病大便不通

大麻仁（研入）　川大黃（剉碎微炒各二兩）　郁李仁（湯浸去皮研入）　羚羊角屑　木通（剉各一兩）

右為細末入研了藥令匀煉蜜和丸如梧子大每服不計時候以温水調下三十丸

承氣丸（出聖惠方）　治熱病十餘日不大便者服之

川大黃（剉碎微炒）　川芒硝（各二兩）　郁李仁（湯浸去皮別研）　枳實（麸炒）

令色黄　大麻仁研入各一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以温水下三十丸末利再服

三黄丸出聖惠方　治熱病壅熱大便不通

黄連去鬚　川大黄剉碎微炒　黄芩各一兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服不計時候以温水調下三十丸

牽牛子丸出聖惠方　治熱病後風氣壅滞胷膈聚痰大便

不通

牽牛子八兩四兩生四兩微炒擣羅取末四兩　木通一兩剉　青橘皮半兩湯浸去白瓤　桑根白皮三分剉

右為末入牽牛子末都令匀煉蜜和擣三二百杵丸如桐子大每服不計時候温水調下三十丸以得通為度

治熱病煩滿目黄赤小便黄出本草

用苜蓿莖葉擣取汁服一升令人吐利即愈一方用

根

熱病小便不通

論

夫熱病毒氣未除表裏不解熱在膀胱則流于小腸熱盛則脾胃乾津液少故小便不通也

方

滑石散 出聖惠方 治熱病熱毒氣壅心腹脹滿小便不通

滑石二兩 甜葶藶一合隔紙炒令紫色 猪苓一兩去黑皮 甘草半兩炙微

赤茯苓一兩剉　漢防己半兩剉　木通半兩剉

右為麄散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

木通散出聖惠方　治熱病小便不通或淋瀝疼痛

木通剉　琥珀各一兩　赤芍藥　枳實麩炒微黄　茅根剉　甘艸炙微赤剉各半兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

當歸散出聖惠方　治熱病小便不通小腸疼痛

當歸三分判微炒　子芩　葵子　車前子　榆白皮各判半兩

右為細散每服用煖生地黄汁一小盞調下二錢不計時候服之

赤茯苓散出聖惠方　治熱病小便不通心神煩躁小腹滿悶

赤茯苓　赤芍藥　葵子　瞿麥　木通判　川芒

硝各一兩

右為粗散每服四錢水一中盞入葱白二莖煎至六分去滓不計時候温服

石韋散 治熱病小便不通

石韋去毛 瞿麥各一兩 木通剉 甘艸炙微赤剉 子芩各半兩 葵子三合

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

冬葵子散　治熱病小便赤澁不通

冬葵子　滑石各二兩　赤茯苓　木通剉各二兩　茅根剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病小便不通淋瀝如血方

大麻根二兩　亂髮灰二錢

右先將麻根以水一大盞煎至六分去滓下髮灰調令勻頓服之

又方

生乾地黄三分　蒲黄　鬱金各半兩

右為細散每服濃煎葵根湯調下二錢不拘時候服

又方

滑石　石鷰各一兩

右為細散研令極細每服不計時候葱白湯調下一錢

滋陰化氣湯　治因服熱藥過多小便不利諸藥不効

或臍下悶痛不可忍者

黄連炒去鬚　黄蘗炒　甘草炙各等分

右㕮咀每服三錢水三盞煎至一盞去滓食前温服晝夜不適加知母

問此如何得利答曰無陽者陰無以生無陰者陽無以化又云膀胱者津液之府氣達則能出焉熱藥過多乃陰亡也二藥助陰使氣得化故小便得以通也或以滋腎丸服之其効更速

熱病痢下膿血

論

夫熱病熱毒氣𦆵攻于腹胃內乘于血血性得熱則流散因其大腸虛血滲入腸內與津液相摶積熱蘊結血為膿故成膿血痢也

方

犀角散 治熱病毒熱不解日晚即壯熱便痢鮮血痢無期度不下飲食

犀角屑 茜根剉 黄芩各一兩 黄連二兩去鬚 地榆一兩半

梔子仁半兩

右爲麄散每服四錢以水一盞入韭白兩莖煎至六分去滓不計時候温服

黄連飲子 治熱病便痢無度煩憒不安

黄連一兩去鬚微煩 梔子仁二十枚搥碎 薤白二合切

右以水二大盞煎至一盞三分去滓不計時候分三服

當歸散　治熱病熱毒痢下赤白腹中疼痛

當歸剉微炒　黄連去鬚微炒　阿膠擣碎炒令黄燥　酸石榴皮各二兩　甘艸一兩炙微赤剉　黄蘗微炒剉　乾薑炮裂剉各一兩

右為粗散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候温服

升麻散　治熱病毒氣攻胃大便時或瀉血煩悶妄語

川升麻一兩　川大黄剉碎微炒　地榆剉　赤芍藥　枳殼麩炒微黄去瓤　黄芩　甘艸炙微赤剉各半兩　當歸三分

右為麄散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓不拘時候溫服

茜根散　治熱病下痢膿血不止

茜根一兩　黄芩三分　梔子仁一分　阿膠半兩搗碎炒令黄燥

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病後熱毒入腸胃下黄赤汁及爛肉等

赤石脂二兩搗碎　豉一合　薤白三莖切　梔子仁七枚

右以水二大盞煎至一盞三分去滓不拘時候分溫三服

治熱病卒下膿血無度方

黄連(去鬚微炒)　鼠尾艸　地榆(剉各二兩)

右為麄散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

石脂散　治熱病下痢膿血

白石脂(一兩燒過)　烏梅肉(微炒)　黄連(去鬚微炒)　胡粉(炒令微黄)　訶梨

勒皮煨 檳榔 甘艸炙微赤剉各半兩

右為散每服以粥飲調下二錢不計時候服

鹿角膠散出聖惠方 治熱病六七日後毒氣不散下膿血不止

鹿角膠一兩搗碎炒令黃燥 黃芩去鬚微炒 黃連去鬚微炒 胡粉炒令色微黃各半兩

右為散每服以冷粥飲調下二錢不拘時候服

黃連散出聖惠方 治熱病毒痢下膿血腰臍下痛

黄連去鬚微炒　龍骨　當歸剉微炒各一兩　牛黄一分細研　麝香一錢細研

右為細散每服以粥飲調下二錢不拘時候服

地榆散出聖惠方　治熱病壯熱頭痛四肢煩疼下痢黄赤色日夜十餘行及嘔吐不下食

地榆　龍骨　陳橘皮湯浸去白瓤焙　人參去蘆頭　酸石榴皮　黄芩各一兩　厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為細散每服以粥飲調下二錢不拘時候服

犀角散出聖惠方 治熱病熱毒攻臟腑下利膿血煩渴不止

犀角屑 黄連去鬚微炒 赤芍藥 黄芩 側栢葉 阿膠擣碎炒令黄燥 烏梅肉微炒 甘草炙微赤剉各三分

右為散每服以粥飲調下二錢不計時候服

治熱病卒痢膿血無度方出聖惠方

黄連三兩去鬚 龍骨四兩 阿膠二兩擣碎炒令黄燥

右為細散每服以粥飲調下一錢不拘時候服

治熱病熱毒攻腸胃下黄赤汁及爛肉壯熱腹痛方出聖惠方

梔子仁三七枚 豉二合 薤白一握切

右以水二盞煎至一盞去滓不計時候分為二分

小品犀角湯 治熱毒赤汁及赤如腐爛血及赤滯如魚腦腹痛壯熱諸藥無効

黄蘗 黄芩各一兩半 白頭翁 當歸 桑寄生 甘艸炙各一兩 黄連二兩 牡蠣煅 石榴皮各一兩半 犀角屑 艾

葉各半兩

右切以水八升煮取三升分三服忌猪肉冷水海藻菘菜

一方出肘後方 治熱病後下痢膿血不止不能食

用白龍骨末米飲調方寸匕服

治熱病不觧而下痢欲死出本艸

以龍骨半斤擣研水一斗煮取五升候極冷稍稍飲得汗即愈

熱病後虛勞

論

夫熱病新差臟腑猶虛血氣未復若食過度喜怒無恒濈浴梳頭言語思慮則寒熱四肢不舉口苦舌乾心煩盗汗不能飲食肢體羸瘦此由勞動太早不能節宜寒熱之氣入于經絡傅于臟腑變動多端故成虛勞之候也

方

鱉甲飲子 出聖惠方 治熱病後體氣尚虛用力太早遂生寒熱四肢乏力宜服

鱉甲 塗醋炙令微黃去裙襴 甘草 炙微赤剉各半兩 柴胡 一兩去苗 人參 去蘆頭 白朮 各一分 豉 一合 雄鼠糞 七枚微炒別研

右細剉拌令勻分作二服每服以水二大盞入生薑一分葱白三莖煎至一盞去滓入研了鼠糞攪勻不拘時候溫服

黃耆散 出聖惠方 治熱病後體虛成勞氣力羸弱或寒或

熱狀如瘧四肢煩悶

黄蓍剉　陳橘皮湯浸去白麩焙　白术各三分　知母　桑根白皮各半兩　鱉甲塗醋炙令黄去裙襴一兩　甘艸一分炙微赤剉　豉一合

右為散每服五錢以水一大盞入葱白三莖生薑半分煎至五分去滓不計時候温服

柴胡散出聖惠方　治熱病後虛勞煩熱四肢疼痛小便赤黄不欲飲食宜服

柴胡去苗　生乾地黄　黄連去鬚　地骨皮　赤茯苓各一

兩 枳殻一分麩炒微黄去瓤 甘草半兩炙微赤剉 鼈甲三分塗醋炙微黄去裙襴

知母半兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不拘時候温服

虎頭骨散出聖惠方 治熱病後虛勞氣發作寒熱乍進乍退頭痛眼睛疼不思飲食

虎頭骨一兩半塗酥炙令黄 白茯苓 白朮 黄耆剉 柴胡去苗 沉香各一兩 人參去蘆頭 陳橘皮湯浸去白瓤焙各三分 麥門

冬桃仁去心 湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各一兩半　赤芍藥　桂心

當歸　五味子　甘草炙微赤剉各半兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候温服

人參散　治熱病後虛勞盜汗口苦不得睡卧四肢煩痛舌乾卷澁

人參去蘆頭　赤芍藥　柴胡去苗根　白茯苓　黄耆剉

牡蠣燒為粉　鼈甲塗醋炙微黃去裙襴各一兩　麥門冬一兩半去心焙　甘

草半兩炙微赤剉

右為麁散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

黄耆丸 治熱病後虚勞四肢無力或時寒熱盜汗心中虚悸不能飲食漸羸瘦

黄耆剉 人參去蘆頭 牡蠣燒過 白术 沉香 茯神 白芍藥 木香 陳橘皮湯浸去白瓤焙 五味子 地骨皮 鬼箭羽 甘草炙微赤剉 牛黄細研 鱉甲塗醋炙令微黄去裙

榔各半兩麥門冬一兩半去心焙麝香半分細研

右為末入牛黄麝香研令匀煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒下三十丸不飲酒用粥飲下亦得

獺肝丸　治熱病後虛勞及骨蒸日漸黄瘦四肢羸瘠不思食

獺肝微炙天靈蓋塗醋炙令微黄犀角屑各一兩柴胡去苗黄連去鬚枳殼麩炒微黄去瓤栢脂細研各三分川升麻半兩金箔細研銀

箔（細研各五十片）牛黄（細研）麝香（細研各半兩）

右為末入金銀箔牛黄麝香栢脂等煉蜜和擣三二百杵丸如桐子大每服食前以童子小便三合浸豉取汁下二十丸

治熱病新瘥早起及多食復發方

用梔子十枚水三升去滓温服卧令微汗若食不消加大黄三兩

葛根飲　主熱病勞復身體痛天行壯熱煩悶

葛根一兩　葱白一握　豉半升　米一合

右先切葛根以水九升煑七升則納葱白更煑取四升去葛根及葱白滓訖則納豉及少許米煑取三沸並濾去米等滓分四服當有汗出即瘥明旦又更作服忌猪蒜等

加減大建中湯　治虚勞發熱方見本門心腹滿脹類

芍藥散　治陰虚發熱

芍藥　黄蓍　甘艸　青蒿各一兩半

右為粗散末每服五錢水二盞煎一盞去滓溫服

普濟方卷一百五十三